

# FASAN

*Phasianus colchicus*

Ynglebestand: Ikke estimeret

Bestandsudvikling 1976-2018:

Yngletid: Moderat tilbagegang ▼

Vinter: Moderat fremgang ▲

Udbredelse: ➤

|           | Atlas I (1971-74) | Atlas II (1993-96) | Atlas III (2014-17) |
|-----------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Kvadrater | 1882 (87 %)       | 1973 (91 %)        | 1971 (87 %)         |
| Ændring   | -                 | +4 %               | -4 %                |

Træk: Standfugl

DK rødliste: NA (Ikke mulig at rødlistevurdere)



Foto: Jan Striver

## UDBREDELSE OG ÆNDRINGER

Fasanen er fundet ynglende i 1971 kvadrater (87 %), heraf sikkert ynglende i 572 kvadrater (26 %). Arten er udbredt over hele landet inkl. mindre øer bortset fra Saltholm. Der ses dog enkelte huller i udbredelsen først og fremmest i Thy, på Holmsland Klit, omkring Blåvand samt i Storkøbenhavn. Bortset fra på Saltholm fandtes nogenlunde de samme udbredelseshuller også i de tidligere atlas, og generelt har udbredelsen været stabil.

Ynglebestandens tæthed er størst på Midt-, Vest- og Sydsjælland, hvilket tydeligt afspejler vildtudbyttets størrelse (Aarhus Universitet 2019). Vinterbestandens tæthed er størst i Sydsjælland samt omkring Østfyn og Aalborg.

Også i Skåne, Tyskland og Storbritannien er udbredelsen stabil, hvorimod arten i Halland har øget sin udbredelse i mindre grad.

## DÆKNING


Fasanens talrighed og synlige optræden samt kokkens hyppige og højlydte skogen betyder, at arten er nem at registrere, og arten vurderes at være godt dækket i projektet, i hvert fald som sandsynligt ynglende.

Knap en tredjedel af registreringerne gælder således territoriehævdelse (sandsynlig ynglen), og fasanen er i top-10 over arter med denne registreringstype. Til gengæld er det svært at

## Udbredelse

2014-2017

- 582 sikkert ynglende
- 1.197 sandsynligt ynglende
- 192 muligt ynglende



finde ynglebevis i form af reder og kuld, men dog er knap en tredjedel af registreringerne sikre ynglefund i relation hertil. Der er imidlertid sket den bemærkelsesværdige udvikling fra Atlas I og II til Atlas III, at hvor 61-67 % af registreringerne i de to første atlas gjaldt sikre ynglefund og 19-36 % gjaldt sandsynlige ynglefund, er det nærmest omvendt i Atlas III med 30 % sikker ynglen og 61 % sandsynlig ynglen. Noget kunne tyde på, at observatørerne måske er blevet dårligere – eller mindre villige – til at registrere fasanen som sikkert ynglende.

## BESTANDSSTØRRELSE

Den aktuelle ynglebestand er ikke estimeret. Et tidligere estimat på baggrund af punkttællingerne lød på 280.000 par midt i 1980'erne (Braae & Kayser 1985). Artens vildtlevende bestand opretholdes muligvis i stadig højere grad ved udsætning, end ved at arten rent faktisk yngler i naturen (Vildtforvaltningsrådet 2006). Artens punkttællingsindeks tyder på en vis tilbagegang for den fritlevende fasanbestand siden 1995, og det konstante vildtudbytte kan dermed afspejle en forøgelse i omfanget af udsætning – der i givet fald kan anslås til at udgøre ca. 200.000 fugle årligt – siden omkring 1990. Vildtudbyttet er som nævnt stabilt (Aarhus Universitet 2019).

Den europæiske ynglebestand estimeres til 4,14-5,37 mio. par.

## STATUS OG BESKYTTELSE

Fasanen er fortsat en almindeligt udbredt ynglefugl i Danmark, hvilket ikke ændres af den tilsyneladende mindskede bestandsstørrelse siden Atlas I og II. Den væsentlige faktor i opretholdelsen af artens ynglebestand er udsætning i jagtøjemed, hvilken fortsat har et stort omfang, omkring en million fugle om året (Hansen 2016).

Arten må jages i perioden 1/10-31/1, men er næppe negativt påvirket af jagten, især ikke når den massive udsætning af arten tages i betragtning. Set fra et naturbeskyttelsessynspunkt burde arten slet ikke findes vildtlevende i Danmark.

## ENGLISH SUMMARY

The Common Pheasant (*Phasianus colchicus*) was recorded breeding in 87% of the atlas squares, in 26% as confirmed breeding. The species is distributed virtually throughout the country, and the distribution has been stable from Atlas I to II and from Atlas II to III. The current Danish breeding population of the Common Pheasant has not been estimated.

Artsopslaget er forfattet af Thomas Vikstrøm.


## REFERENCER

- Braae, L. & Kayser, B. 1985: Hvor mange fugle yngler der i Danmark? – *Fugle 2*: 30-31.
- Hansen, K. 2016: Til kamp for 1,2 mio. skydefugle. <https://gylle.dk/til-kamp-for-12-mio-skydefugle/>.
- Vildtforvaltningsrådet 2006: Indfangning, udsætning og jagt på fasan, agerhøne og gråand i Danmark. <https://www.ft.dk/samling/20051/beslutningsforslag/B34/bilag/2/242933.pdf>
- Aarhus Universitet 2019: <http://fauna.au.dk/jagt-og-vildtforvaltning/vildtudbytte/udbyttet-online-siden-1941/kort/>

### Ændringskort Atlas I til Atlas III

1971-74 – 2014-17


- ▲ 11 nye kvadrater i Atlas III
- ▲ 209 kun ynglende i Atlas III
- 1.751 ynglende i både Atlas I og Atlas III
- ▼ 131 kun ynglende i Atlas I




### Ændringskort Atlas II til Atlas III

1993-96 – 2014-17

- ▲ 12 nye kvadrater i Atlas III
- ▲ 116 kun ynglende i Atlas III
- 1.843 ynglende i både Atlas II og Atlas III
- ▼ 130 kun ynglende i Atlas II



### Gennemsnitlig tæthed pr. km<sup>2</sup>, baseret på TimeTælleTure Yngletid



### Gennemsnitlig tæthed pr. km<sup>2</sup>, baseret på TimeTælleTure Vinter

